

Aoûtat

Neotrombicula autumnalis · Invertébré

Carte d'identité

- TAILLE** Larve de 0,2 à 0,3 mm environ, adulte d'environ 0,8 à 1 mm
- POIDS** Inférieur à 1 mg, sans estimation précise publiée
- IL VIT** Le cycle dure souvent près d'un an, avec une phase larvaire de quelques jours sur un hôte ; la
- IL MANGE** La larve prélève des liquides issus des cellules superficielles de la peau des animaux, tandis
- HABITAT** Il vit surtout dans la litière, l'humus et les herbes basses des jardins, prairies, lisières et



Où vit-il ?

Europe et régions tempérées voisines d'Asie

Ce qu'il faut retenir

- La larve mesure moins d'un tiers de millimètre et passe souvent inaperçue.
- Elle s'accroche quelques jours à la peau d'un mammifère ou parfois d'un oiseau.
- Les nymphes et les adultes vivent dans le sol et mangent de petits invertébrés.
- Les démangeaisons apparaissent souvent plusieurs heures après l'exposition.

Comment l'aider ?

- Évitez les acaricides et insecticides à large spectre dans les zones herbeuses, car ils touchent de nombreux petits animaux du sol.
- En fin d'été, portez un pantalon fermé aux chevilles dans les herbes hautes, puis lavez les vêtements après la balade.