

Blastophage du figuier

Blastophaga psenes · Invertébré

Carte d'identité

- TAILLE** Femelle ailée : environ 1,5 à 2 mm de long ; mâle : environ 1 à 1,5 mm, sans ailes
- POIDS** Quelques dixièmes de milligramme, avec des variations selon le sexe
- IL VIT** Adulte : souvent 1 à 3 jours, parfois moins d'une semaine ; la durée totale dépend du
- IL MANGE** Les adultes se nourrissent très peu et utilisent surtout les réserves accumulées pendant
- HABITAT** Il vit dans les figes de figuiers cultivés ou sauvages, surtout dans les régions chaudes du



Où vit-il ?

Pourtour méditerranéen et sud-ouest de l'Asie, avec des introductions liées à la culture du figuier

Ce qu'il faut retenir

- Une femelle mesure seulement quelques millimètres et possède des ailes transparentes.
- Elle pollinise les figuiers en entrant par une petite ouverture de la figue.
- Les larves se développent dans des fleurs cachées à l'intérieur de la figue.
- En France, les observations concernent surtout les régions méditerranéennes et les figuiers.

Comment l'aider ?

- Conservez un figuier local dans un jardin chaud et limitez les insecticides autour de sa floraison.
- Laissez quelques figes tomber naturellement afin de maintenir le cycle local, sans déplacer les figes vers une autre région.