

Carpocapse des pommes

Cydia pomonella · Invertébré

Carte d'identité

- TAILLE** 14 à 22 mm d'envergure chez l'adulte, avec un corps d'environ 8 à 10 mm
- POIDS** environ 10 à 30 mg chez l'adulte, selon le sexe et les conditions de développement
- IL VIT** L'adulte vit généralement 1 à 2 semaines. Le cycle complet, de l'œuf à l'adulte, dure souvent 1
- IL MANGE** La chenille se nourrit surtout des pépins et de la chair des pommes, poires, coings et
- HABITAT** Il fréquente les vergers, les jardins, les haies et les lisières de forêt, surtout dans les



Où vit-il ?

Europe et Asie tempérées, puis régions fruitières où l'espèce a été introduite

Ce qu'il faut retenir

- La chenille entre dans le fruit par la peau, puis gagne rapidement la zone des pépins.
- Les adultes sont surtout actifs au crépuscule et pendant les nuits douces.
- En France, une ou deux générations peuvent se succéder selon la région et la météo.
- L'espèce est commune dans les vergers, mais ses populations sont difficiles à mesurer.

Comment l'aider ?

- Ramassez régulièrement les fruits tombés et abîmés afin de réduire le nombre de chenilles qui retournent se cacher dans le sol ou l'écorce.
- Utilisez un piège à phéromones pour observer les périodes de vol et demandez conseil à une jardinerie ou à un service agricole avant tout traitement.