

# Cétoine funeste

*Oxythyrea funesta* · Invertébré

## Carte d'identité

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAILLE</b>   | 8 à 13 mm de longueur du corps                                                                  |
| <b>POIDS</b>    | non documenté de façon fiable                                                                   |
| <b>IL VIT</b>   | Le cycle de développement dure généralement environ un an, tandis que la durée de vie           |
| <b>IL MANGE</b> | Les adultes consomment surtout du pollen et des parties florales, tandis que les larves se      |
| <b>HABITAT</b>  | Elle fréquente les prairies sèches, friches, lisières, vergers et jardins fleuris, généralement |



## Où vit-il ?

Europe méridionale et centrale, pourtour méditerranéen et ouest de l'Asie

## Ce qu'il faut retenir

- Un coléoptère de 8 à 13 millimètres, noir avec des taches blanches irrégulières.
- Les adultes visitent surtout les fleurs de mai à juillet, par temps chaud et ensoleillé.
- Ses larves vivent dans le sol et consomment des débris végétaux en décomposition.
- En France, elle est largement observée dans les milieux ouverts et les jardins fleuris.

## Comment l'aider ?

- Laissez fleurir une partie du jardin jusqu'à la fin de l'été et plantez plusieurs espèces locales qui produisent du pollen.
- Conservez un peu de feuilles mortes, de bois très décomposé ou de compost mûr dans un endroit calme, sans retourner régulièrement tout le sol.