


Charançon rouge des palmiers

Rhynchophorus ferrugineus · Invertébré

Carte d'identité

- TAILLE** 2 à 4 cm pour le corps adulte, sans compter le rostre
- IL VIT** Environ 2 à 3 mois au stade adulte ; le cycle complet dure généralement 3 à 6 mois selon
- IL MANGE** Les larves creusent les tissus vivants des palmiers, tandis que les adultes consomment
- HABITAT** Il vit dans les palmiers cultivés ou sauvages des régions chaudes, surtout dans les



Où vit-il ?

Asie tropicale et subtropicale, désormais étendue aux régions chaudes du pourtour méditerranéen

Ce qu'il faut retenir

- Sa larve vit cachée dans le palmier et peut rester invisible plusieurs mois.
- L'adulte mesure généralement 2 à 4 centimètres, rostre compris.
- Les palmiers-dattiers, les Phoenix et les Washingtonia sont particulièrement touchés.
- En France, il est surtout présent dans les régions méditerranéennes et en Corse.

Comment l'aider ?

- N'achetez pas et ne déplacez pas un palmier dont la couronne est affaissée ou présente des traces de galeries.
- Si vous soupçonnez une infestation dans le sud de la France ou en Corse, photographiez le palmier et contactez la DRAAF, le service régional de l'alimentation ou la FREDON de votre région.