

Crapaud de Fowler

Anaxyrus fowleri · Amphibien

Carte d'identité

TAILLE	5 à 9 cm de longueur du museau au cloaque, les femelles étant généralement
POIDS	environ 20 à 60 g chez l'adulte, avec des variations selon le sexe, la saison et la région
IL VIT	Environ 5 à 10 ans dans la nature ; des individus peuvent vivre plus longtemps en
IL MANGE	Il capture surtout des fourmis, coléoptères, mouches, chenilles et autres petits invertébrés,
HABITAT	Il fréquente les sols sableux, les lisières, les prairies, les pinèdes claires, les dunes et les jardins
STATUT	préoccupation mineure



Où vit-il ?

est et centre-est de l'Amérique du Nord

Ce qu'il faut retenir

- Il mesure généralement moins de 9 centimètres, sans compter une queue absente chez l'adulte.
- Ses taches sombres portent souvent trois verrues ou davantage, un indice utile pour l'identifier.
- Les mâles se rassemblent au printemps dans les mares pour produire un long trille musical.
- Ses œufs et ses têtards se développent dans l'eau, tandis que l'adulte vit surtout sur la terre ferme.

Comment l'aider ?

- Ne relâchez jamais en Amérique du Nord un amphibien détenu en captivité et ne déplacez pas un crapaud d'une mare à une autre.
- Si vous voyagez dans son aire, évitez de franchir les zones humides en véhicule et ne ramassez pas les amphibiens, afin de limiter les blessures et la transmission de maladies.