

Dermatobie humaine

Dermatobia hominis · Invertébré

Carte d'identité

TAILLE	Adulte : environ 12 à 18 mm de long ; larve mature : jusqu'à environ 25 mm
POIDS	Non documenté de façon fiable chez l'adulte
IL VIT	L'adulte vit généralement quelques jours à une dizaine de jours ; la larve reste dans la
IL MANGE	La larve se nourrit de liquides et de tissus présents dans une petite cavité de la peau d'un
HABITAT	Elle fréquente les forêts tropicales et subtropicales, les lisières, les pâturages et les



Où vit-il ?

Du Mexique à l'Amérique du Sud tropicale et subtropicale

Ce qu'il faut retenir

- Sa larve provoque une myiase furonculaire, avec un petit orifice respiratoire dans la peau.
- La femelle fixe ses œufs sur un moustique ou une autre mouche qui les transporte.
- Elle vit naturellement du Mexique à l'Amérique du Sud tropicale.
- Les cas humains observés en France sont généralement liés à un séjour dans une zone tropicale.

Comment l'aider ?

- Après un séjour en Amérique tropicale, couvrez les lésions cutanées et utilisez une protection contre les piqûres d'insectes selon les conseils locaux.
- Si un furoncle persistant apparaît après un voyage, consultez rapidement un médecin et indiquez les pays visités ; ne tentez pas de retirer une larve vous-même.