


Pou rouge des volailles

Dermanyssus gallinae · Invertébré

Carte d'identité

- TAILLE** Environ 0,6 à 1 mm de longueur corporelle à l'âge adulte, selon le sexe et le
- POIDS** Masse individuelle très faible ; aucune fourchette suffisamment fiable n'est
- IL VIT** Plusieurs mois selon la température, l'humidité et l'accès au sang ; une survie
- IL MANGE** Les nymphes et les adultes prélèvent du sang, principalement sur des oiseaux
- HABITAT** Fentes des poulaillers, bâtiments fréquentés par des oiseaux et matériaux des nids,



Où vit-il ?

Répartition aujourd'hui presque mondiale, largement étendue par les activités humaines ; origine naturelle difficile à préciser

Ce qu'il faut retenir

- L'adulte possède huit pattes et mesure généralement moins d'un millimètre.
- Il devient rouge après avoir prélevé du sang sur un oiseau.
- La journée, il se réfugie dans les fissures proches des perchoirs.
- Une forte infestation peut provoquer une anémie chez les poules.

Comment l'aider ?

- Inspectez régulièrement les dessous de perchoirs et les fissures, particulièrement pendant les périodes chaudes. Un poulailler conçu avec des surfaces accessibles facilite le nettoyage et la détection.
- En cas d'infestation, demandez au vétérinaire une stratégie adaptée aux oiseaux et au bâtiment. N'appliquez aucun insecticide domestique, produit pour chien ou mélange artisanal sur les poules ; certains produits exposent les animaux et peuvent contaminer les œufs.