

Tique des bois

Ixodes ricinus · Invertébré

Carte d'identité

TAILLE	Adulte à jeun : environ 2 à 4 mm de long, femelle généralement plus grande que
POIDS	Environ 1 à 3 mg à jeun chez l'adulte ; une femelle gorgée peut dépasser 50 mg selon la
IL VIT	Environ 2 à 3 ans dans la nature, parfois davantage selon le climat et la disponibilité des
IL MANGE	Elle se nourrit uniquement de sang, en prélevant un repas sur un mammifère, un oiseau ou
HABITAT	Elle fréquente les sous-bois humides, les lisières, les haies, les herbes hautes et les jardins



Où vit-il ?

Europe et régions tempérées de l'ouest de l'Asie

Ce qu'il faut retenir

- Une femelle adulte peut multiplier son poids plusieurs dizaines de fois pendant son repas sanguin.
- Les larves ont six pattes, tandis que les nymphes et les adultes en ont huit.
- Elle peut transmettre la borréliose de Lyme et d'autres agents infectieux.
- Une inspection rapide du corps réduit le temps pendant lequel une tique reste fixée.

Comment l'aider ?

- Portez un pantalon long et des chaussures fermées dans les herbes hautes, puis inspectez votre peau et celle des enfants après la balade.
- Retirez une tique avec un tire-tique en la saisissant au plus près de la peau, puis désinfectez et surveillez la zone pendant plusieurs semaines.